

令和8年度 乳幼児・小学生・中学生・高校生の予防接種一覧表

種類	ワクチン名		接種回数	周知方法	出 生 時 2 か 月 3 か 月 5 か 月 6 か 月 7 か 月 8 か 月 9 か 月 12 か 月 15 か 月 18 か 月 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 6 歳 7 歳 7 歳 6 か 月 8 歳 9 歳 10 歳 11 歳 12 歳 13 歳 ~																						
					凡例： 法律で定められている時期 望ましい接種時期																						
定期接種 (全額公費)	小児肺炎球菌 (不活化ワクチン)	4回	初回 (3回)	訪問時	生後2か月～生後7か月の接種が望ましい (27日以上あけて3回接種)																						
			追加 (1回)		初回3回終了後60日以上あけて生後12か月～生後15か月までに1回接種																						
	B型肝炎 (不活化ワクチン)	3回	1・2回目	訪問時	1回目は生後2か月、2回目は生後3か月の接種が望ましい (27日以上あけて2回接種)																						
			3回目		1回目と3回目は139日 (20週) 以上あけて生後7か月～生後8か月の接種が望ましい(1回)																						
	【五種混合】 ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ (不活化ワクチン)	4回	1期初回 (3回)	訪問時	生後2か月～生後5か月の接種が望ましい (20日以上あけて3回)																						
			1期追加 (1回)		1期初回3回終了後6か月～18か月あけて1回接種																						
	ロタウイルス (経口生ワクチン)	1価ワクチン (2回)		訪問時	生後6週～生後24週未満までに完了 (27日以上あけて2回接種)																						
		5価ワクチン (3回)		広域接種等	生後6週～生後32週未満までに完了 (27日以上あけて3回接種)																						
	BCG (生ワクチン)	1回		訪問時	生後5か月～生後8か月の接種が望ましい (1回)																						
	MR (麻しん風しんワクチン) (生ワクチン)	2回	1期 (1回)	訪問時	生後12か月～生後18か月の接種が望ましい (1回)																						
			2期 (1回)	通知 (就学1年前)	5歳～7歳未満までに1回接種 (小学校就学前の年長児)																						
	水痘 (水ぼうそう) (生ワクチン)	2回	1回目	訪問時	生後12か月～生後15か月の接種が望ましい (1回)																						
			2回目		1回目終了後6か月～12か月をあけての接種が望ましい (1回)																						
任意接種	日本脳炎 (不活化ワクチン)	4回	1期初回 (2回)	通知 (3歳到達の翌月)	3歳～4歳の接種が望ましい (6～28日あけて2回接種)																						
			1期追加 (1回)	通知 (小学4年)	1期初回2回終了後約12か月あけて4歳～5歳の接種が望ましい (1回)																						
			2期 (1回)		1期追加終了後9歳の接種が望ましい(1回)																						
	【二種混合】 ジフテリア・破傷風 (不活化ワクチン)	1回	2期	通知 (小学6年)	四種混合1期追加終了後11歳の接種が望ましい(1回)																						
	ヒトパピローマウイルス (不活化ワクチン)	2回 (年齢、接種間隔次第では3回)		通知 (中学1年～高校1年の女子)	標準的な接種期間の中学1年生 (13歳) から高校1年生の女子を対象																						
任意接種	おたふくかぜ (生ワクチン)	2回		—	1回目・・・生後12か月～生後18か月の接種が望ましい 2回目・・・5歳～7歳未満までの接種が望ましい (小学校就学前の年長児)																						
	インフルエンザ (不活化ワクチン)	生後6か月～13歳未満年2回 13歳以上は年1回		—	毎年10月から11月の接種が望ましい																						

※訪問時・・・生後1か月前後の赤ちゃん訪問